

Dorperas šķine



Izveidota 1950. gadā Dienvidāfrikā, izmantojot Dorsetas ragainās un Persijas melngalves aitas. Mērķis izveidot auglīgas, gaļīga ķermeņa aitas, kuras piemērotas ekstensīvas un apstākļiem.

Vidēja auguma aitas ar dziļu ķermeņa vidusdaļu, labu ribu velvējumu, stipru muskulatūru. Aitām balts ķermenis ar melnu kaklu un galvu, ideāla ir galva ar nelieliem ragiem vai bez tiem. Vilna viegla, īsa, neveido blīvu vilnsegu. Viegla dzemdības, labs pienīgums un mātes īpašības.

Aitu māšu dzīvmasa 70 – 80 kg, teķu - 100 –120 kg. Teķu augstums skaustā - 65-75 cm, Aitu māšu augstums skaustā - 60-70 cm.

Šķirnes aitas var audzēt dažādās ekstrēmās (ļoti karsts, ļoti auksts) klimatiskajās joslās.

Labi izmanto dažādās kvalitātes ganības, ēd zāli, lapas, krūmus.

Var apļecināt visu gadu, viegla dzemdības, jēri enerģiski, dzīvotspējīgi. Aitas divu gadu laikā var atnesties 3 reizes, vidējais jēru skaits aitu mātei gadā līdz 2.25, pirmo reizi atnesoties, parasti dzimst 1 jērs.

Piemērotas ekstensīvai nobarošanai. Liemenī liels muskuļaudu īpatsvars - līdz 65% un tikai līdz 22% tauku. Gaļa maiga, bez specifiskās piegaršas.