

# Romanovas šķirne



Romanovas aitu šķirne izveidota Volgas upes ielejā Jaroslavļas apgabalā 19.gs. Romanovas aitas ir rupjvilnas gaļas–kažokādu aitu šķirne. Romanovas šķirni plaši izmanto jaunu šķirņu veidošanā, auglības palielināšanai, kā arī rūpnieciskā krustošanā, izmantojot iegūtās pusasiņu Romanovas šķirnes aitu mātes gaļas jēru ražošanai. Romanovas šķirni audzē Krievijā, Eiropas valstīs, ASV, Kanādā. Mūsu valstī Romanovas šķirni ieveda 1980.gadā.

Vilnsega ir pārklāta ar dubultiem vilnas matiņiem. Pirmā ir dūnmati ar vidējo vilnas šķiedras diametru 20.9 mikroni un akotmati ar vidējo vilnas šķiedras diametru 71.9 mikroni. Nemazgātas vilnas svars ir apmēram 4.5 kg.

Pieaugušo teķu dzīvmasa standarta tipa Romanovas šķirnei ir 55-80 kg un 40-50 kg aitiņām.

Aitām nav izteikta sezonveida meklēšanās, tās var aplecināt jebkurā gada mēnesī. Aitas, pilnvērtīgi ēdinot, var atnesties divos gados trīs reizes, katrā metienā iegūstot 2-3 jērus. Rekords – 9 jēri metienā. Auglība - 300%.

Jēri piedzimst melni, bet no 2 - 4 nedēļu vecuma tiem intensīvi sāk augt balti vai gaiši pelēki dūnvilnas matiņi. Pēc 3 - 4 mēnešu vecuma vilnsega iegūst Romanovas jēriem raksturīgo pelēko krāsu. No 5–10 mēnešus veciem jēriem iegūst labākās kažokādas (ne tikai aitādas) pasaulē. Vieglas, siltas, skaistā pelēkā krāsā. No vienas aitas gadā var iegūt 2 - 3 augstvērtīgas jēru kažokādas un 70 – 80 kg diētiskas jēru gaļas, kam nav aitu taukiem raksturīgās piegaršas. Vidējā dzīvmasa jēriem ir 35 kg, kad tos nokauj 8-9 mēnešu vecumā.